

# Dies ist eine Leseprobe aus dem Buch Infektionskrankheiten: Maßnahmen nach der Diagnostik

Erkrankung an oder Verdacht auf/ Ausscheider von	Quarantäne (§ 30 IfSG)	Isolierung in Einrichtungen des Gesundheitswesens nach RKI-Empfehlung	Verbot von Tätigkeit in und Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen (§ 34 (1) IfSG)	Verbot des Besuchs von Gemeinschaftseinrichtungen Kinder < 6 Jahre (§ 34 (1) IfSG)
<b>Noroviren</b>	∅	Dauer der Symptome plus min. 48 h	+ § 34 Abs. 9 IfSG	+
<b>Poliomyelitis</b>	∅	Dauer der Ausscheidung	+	+
<b>Rifttal-Fieber</b>	nein	ggf., aber laut RKI keine Übertragung von Mensch zu Mensch bekannt		
<b>Rotavirus-Gastroenteritis</b>	∅	Dauer der Symptome plus min. 48 h		+
<b>Röteln</b>	∅	bis 7 Tage nach Beginn des Exanths	+	+
<b>SARS-CoV-2</b>	derzeit meist häusliche Isolierung	Isolierzimmer mit Vorraum	+	+
<b>Stomatitis vesicularis (Vesicular stomatitis virus)</b>	∅	Zoonose		

Verbote für Ausscheider (§ 34 (2) IfSG)	Ausschluss wg. Erkrankung in Wohngemeinschaft (§ 34 (3) IfSG)	Maßnahmen bei Kontaktpersonen nach RKI-Empfehlung, bzw. Handb. f. d. öffent. Ges.-Dienst	Kriterien Wiederzulassung
∅	∅		2d nach Genesung ▶
∅	+ Wiederzulassung nur in Abstimmung mit Fachexperten und Gesundheitsamt	Riegelungsimpfung, auch bereits Geimpfte	nur in Abstimmung mit Fachexperten und Gesundheitsamt ▶
∅	∅		▶
∅	∅		Kinder < 6 Jahre 48 h nach Abklingen d. klin. Symptome ▶
∅	empfängliche Personen 21 d nach letztem infektionsrel. Kontakt	aktive Kontaktpersonensuche, MMR(V)-Impfung falls indiziert; Infektionsquelle ermitteln s.a. RKI-Ratgeber Röteln	8 d nach Exanthembeginn ▶
∅	derzeit ja, siehe aktuelle RKI-Empfehlungen	siehe aktuelle RKI-Empfehlungen	14 Tage nach Beginn der Symptomatik min. 2 Tage symptomfrei, zus. med. Personal 2 neg. Abstriche im Abstand von 24 h ▶
∅	∅		▶

Erkrankung an oder Verdacht auf/ Ausscheider von	schriftl. Ärztliches Attest erforderlich	Maßnahmen bei Ausbrüchen RKI-Empfehlung, bzw. Handb. F. d. öffent. Ges.-Dienst	Verbot von Umgang mit Lebensmitteln (§ 42 IfSG) auch bei Krankheitsverdacht	Übertragung durch Muttermilch
◀ Noroviren			ja	
◀ Poliomyelitis	ja	Riegelungsimpfung + Hygiene-Maßnahmen / Desinfektion	ggf. auf Basis von IfSG §16 Abs. 1	
◀ Rifttal-Fieber				
◀ Rotavirus-Gastroenteritis				
◀ Röteln	RKI-Empfehlung	Nachholimpfungen		
◀ SARS-CoV-2				
◀ Stomatitis vesicularis (Vesicular stomatitis virus)				

**Weitere Leseproben finden Sie [hier!](#)**

**Infektionskrankheiten: Maßnahmen nach der Diagnostik**

**2020, Softcover, 80 Seiten**  
**ecomed MEDIZIN**  
**ecomed-Storck GmbH**  
**Preis: EUR 24,99**  
**ISBN 978-3-609-10705-9**



CASPARI

Infektionskrankheiten: Maßnahmen nach der Diagnostik

Meldepflicht – Quarantäne/Isolierung – Teilnahme/ Tätigkeitsverbote – Kontaktpersonen – Blutspende – Anzeigepflichten

**ecomed MEDIZIN**

Blutspende permanenter Ausschluss gemäß Hämotherapie-Richtlinien 2019	Blutspende Rückstellung für [Zeit] gemäß Hämotherapie-Richtlinien 2019	Anzeige als mögliche Berufskrankheit (SGB VII § 202 + Merkbl.)	anzeigepflichtige Tierseuche (TierSeuch AnzV)	meldepflichtige Tierkrankheit (TkrMeldpflV)
	ja			
	ja	3104	+	
	Erkrankte und Kontaktpersonen			
	nach Kontakt 4 Wochen nach Infektion 8 Wochen			